



# Lokale anesthesie - Plaatselijke verdoving - Pools

## Znieczulenie miejscowe

Przy znieczuleniu miejscowym znieczulenie działa miejscowo. Do znieczulenia miejscowego dochodzi przez wykonanie zastrzyku ze środka znieczulającego. Znieczuleniu ulega miejsce, w którym wykonana ma być operacja.

### Kiedy stosuje się znieczulenie miejscowe?

- Do znieczulenia miejscowego dochodzi najczęściej podczas niewielkich operacji wykonywanych w poliklinice. Znieczulenie w wystarczającym stopniu uśmierza ból w trakcie operacji.
- Często anestezjolog miejscowe znieczulenie stosuje dodatkowo do innej formy znieczulenia, którą z Państwem omówił. Jest ona stosowana jako dodatkowe znieczulenie miejsca, które jest operowane. Na przykład, kiedy tego samego dnia wracają Państwo do domu.
- Miejscowe znieczulenie można zastosować również dodatkowo, jeśli blokada nerwów, którą Państwo otrzymali na oddziale chirurgii nie działa skutecznie.

## Działania niepożądane i komplikacje przy znieczuleniu miejscowym

### Ból

Po ustąpieniu znieczulenia pacjent może czuć ból w zoperowanym miejscu.

### Reakcja alergiczna

Pomimo całej ostrożności zawsze może dojść do komplikacji, np. może dojść do reakcji alergicznej wywołanej lekami.

### Gdzie można nas znaleźć?

#### Haarlem Zuid

Boerhaavelaan 22  
2035 RC Haarlem

(023) 224 00 00

#### Haarlem Noord

Vondelweg 999  
2026 BW Haarlem

[www.spaarnegasthuis.nl](http://www.spaarnegasthuis.nl)

#### Hoofddorp

Spaarnepoort 1  
2134 TM Hoofddorp

[info@spaarnegasthuis.nl](mailto:info@spaarnegasthuis.nl)