



# Algehele anesthesie of narcose

---


## **Algehele anesthesie of narcose**

De meest bekende vorm van anesthesie is de algehele anesthesie (narcose) waarbij het hele lichaam wordt verdoofd en u tijdelijk buiten bewustzijn bent. Tijdens een algehele anesthesie worden medicijnen toegediend die ervoor zorgen dat u in een diepe slaap komt. Het lichaam reageert niet op de handelingen van de chirurg.

Voordat u de verdovingsmiddelen krijgt toegediend, wordt de bewakingsapparatuur aangesloten. U krijgt een kapje over de neus en mond waar zuurstof uit komt. Via het infuus dat u gekregen heeft, spuit de anesthesioloog de medicijnen in. U valt binnen zeer korte tijd in een diepe slaap. Om de ademhaling tijdens de anesthesie te kunnen controleren en ondersteunen, wordt meestal een plastic buisje in de mond-keelholte gebracht. Dit gebeurt nog voor de operatie. U merkt daar niets van, want u bent dan al in slaap. Tijdens de anesthesie wordt u door de anesthesiemedewerker en anesthesioloog met behulp van monitoren bewaakt en kunnen we precies zien hoe uw lichaam op de operatie reageert.

Aan het einde van de operatie wordt de toediening van de medicijnen, die u in slaap houden, gestopt en wordt u vanzelf weer wakker.

[Klik op deze link](#) of scan de QR-code hiernaast met uw telefoon om een filmpje over algehele anesthesie te bekijken.



## **Bijwerkingen en complicaties bij algehele anesthesie (narcose)**

### **Slaperig zijn**

U kunt zich kort na de operatie nog slaperig voelen en af en toe in slaap vallen. Dit is heel normaal. Dit komt bijvoorbeeld door de medicijnen die u heeft gekregen tegen de pijn.

### **Pijn**

Als de verdoving uitwerkt kunt u pijn krijgen in het gebied waar u geopereerd bent.

### **Misselijkheid en braken**

Door de verdoving en de operatie kunt u misselijk zijn en misschien moeten braken.

### **Irritatie in de keel**

Heeft u een zwaar of kriebelig gevoel achterin de keel? Dan komt dat van het buisje dat tijdens de operatie in uw keel zat om de ademhaling te kunnen regelen. De irritatie verdwijnt vanzelf binnen een aantal dagen.

### **Allergische reactie**

Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen er altijd complicaties ontstaan, zoals bijvoorbeeld een allergische reactie op medicijnen.

### **Uw gebit**

Bij het inbrengen van het beademingsbuisje is er een klein risico dat uw gebit beschadigd raakt. Als u één of meerdere slechte of loszittende gebitselementen heeft, is dit risico groter.

### **Tinteling en krachtverlies**

Door een ongelukkige houding tijdens de operatie kan een zenuw in de arm of het been beklemd raken. Hierdoor kunnen tintelingen en krachtverlies ontstaan en wat langere tijd blijven bestaan.

## **Waar zijn we te vinden?**

### **Haarlem Zuid**

Boerhaavelaan 22  
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

### **Haarlem Noord**

Vondelweg 999  
2026 BW Haarlem

[www.spaarnegasthuis.nl](http://www.spaarnegasthuis.nl)

### **Hoofddorp**

Spaarnepoort 1  
2134 TM Hoofddorp

[info@spaarnegasthuis.nl](mailto:info@spaarnegasthuis.nl)